

# **PROBLEEM-INSEKTE OP CANOLA**

**J M LAUBSCHER**

**DEPARTEMENT LANDBOU:WES-KAAP**



## *Swartsand- & blou-hawermyt:*



- April/Mei/Junie
- Kenmerkende silwer/wit vlekke – saadlobbe & blare
- Moniteer gereeld – eerste 3-5 weke na opkoms

# *Plantluise*

- Kool-, raap- & perskeluis
- April – Oktober
- Klimaat beïnvloed ontwikkeling
- Vroeë groeistadiums - baie gevoelig
- Beïnvloed blom- & peulvorming
- Gereelde monitering belangrik vir beheer



## *Lusern-erdvlooi:*

- April/Mei/Junie
- Infestasië na peulgewas weidingsfase
- Vreet bladgroen – ronde vreetmerke op blare
- Swaar besmettings – vertraag ontwikkeling – afsterwing
- Moniteer gereeld



## *Ruitrugmot:*



- Julie – Oktober
- Voorkoms -  $\pm$  einde van stingelverlenging
- Warm weerstoestande bevorder ontwikkeling- rosetfase
- Larwes – vreet bladgroen – venstertjie
- Peule – skade oppervlakkig
- Moniteer gereeld

## *Bolwurm:*



- September – Oktober
- Klein larwes – geen skade
- Groot larwes – kleure wissel van liggroen tot donkerbruin
- Groter larwes boor in peule – opbrengverliese
- Moniteer gereeld – skade aan peule

## *Ander insekprobleme:*


- Snywurm




- Groente  
snuitkewer



- Koffiepit=  
Vals draadwurm



- Koolwitjie



- Swartmieliekewer



- Isopoda of “varkie”



•Naak-  
slakke



•Toring-&  
duinslak

